



بعد سحب البويبسات

ما الذي يمكن توقعه

نرجو أن تكوني بخير بعد سحب البويبسات. قد تشعرين بالتعب وبآلام خفيفة شبيهة بآلام الدورة الشهرية، وقد يحدث بعض النزف المهبلي؛ وهذا أمر طبيعي. ويُعد باراسيتامول دواءً آمناً للتخفيف الألم. ويُستحسن استخدام الفوط الصحية بدلاً من **السدادات الفطنية (Tampons)** لتنقيل خطر العدوى.

إرشادات إضافية

يرجى التأكيد من استخدام وسائل الحماية عند ممارسة الجماع إلى أن تعرفي نتيجة العلاج، أو إلى أن تحدث دورة شهرية كاملة وغزيرة إذا كنتِ لن تُجري نفلاً للأجنة.

إذا كنتِ ستُجرين نفلاً طازجاً للأجنة، فستُصرُف لكِ تحاميل بروجسترون إلى جانب نصائح وإرشادات على سالف (Salve) بشأن موعد وطريقة استخدامها.

العلامات والأعراض التي ينبغي الانتباه لها

يرجى التواصل معنا إذا شعرتِ بما يلي: غثيان مستمر، تقيؤ، ألم شديد، تورم في البطن، انخفاض كمية البول التي تطرحينها؛ إذ قد تشير هذه الأعراض إلى فرط تحفيز المبيض (OHSS). ويمكن العثور على مزيد من المعلومات عن متلازمة فرط تحفيز المبيض (OHSS) هنا: <https://mft.nhs.uk/app/uploads/sites/4/2024/01/SMPIL-23-041-OVARIAN-HYPERSTIMULATION-SYNDROME.pdf>

خلال ساعات العمل، يمكنك التواصل مع ممرضات التلقيح الصناعي (IVF) على رقم الهاتف 0161 276 6000 (الخيار 5). وخارج ساعات العمل، إذا كنتِ تقيمين في مانشستر، فيرجى التوجه إلى قسم الطوارئ في مستشفى مانشستر روبيال (Manchester Royal Infirmary). وإذا راجعتِ قسم طوارئ آخر أو أدخلتِ إلى مستشفى آخر بعد سحب البويبسات، فمن الضروري أن تبلغينا بذلك. إذا احتجتِ إلى أي معلومات إضافية أو إلى توضيح، فالرجاء عدم التردد في التواصل معنا عبر سالف (Salve) أو عبر رقم الهاتف أدناه.

بيانات التواصل



0161 276 6000 (الخيار 5)

من الإثنين إلى الجمعة و 09:00-15:00 08:30-15:30 يومي السبت والأحد



[طب الإنجاب - مستشفى سانت ماري](#)